杨波, 陈银萍, 柯昀琪, 等. EDDS对Cd胁迫下三叶鬼针草生长和抗氧化酶系统及Cd积累的影响[J]. 农业环境科学学报, 2018, 37(5): 875–882.
YANG Bo, CHEN Yin-ping, KE Yun-qi, et al. Effects of EDDS on growth, antioxidant enzyme, and Cd accumulation of *Bidens pilosa* L. seedlings under Cd stress[J]. *Journal of Agro-Environment Science*, 2018, 37(5): 875–882.

EDDS对Cd胁迫下三叶鬼针草生长和抗氧化酶系统及Cd积累的影响

杨波, 陈银萍*, 柯昀琪, 闫志强, 余沛东, 师小平

(兰州交通大学环境与市政工程学院, 兰州 730070)

摘要:为探讨乙二胺二琥珀酸(EDDS)对镉(Cd)胁迫下三叶鬼针草(*Bidens pilosa* L.)生长和抗氧化酶系统及Cd积累的影响,采用盆栽实验,研究了40 mg·kg⁻¹ Cd胁迫下,施加0(CK)、0.5、1.5、2.5 mmol·L⁻¹和5.0 mmol·L⁻¹ EDDS后三叶鬼针草生长和抗氧化酶活性及Cd积累的变化。结果表明:施加0.5 mmol·L⁻¹和1.5 mmol·L⁻¹的EDDS利于三叶鬼针草幼苗的生长,株高、根长、地上部鲜干重和地下部鲜干重均显著增加;施加0.5、1.5 mmol·L⁻¹和2.5 mmol·L⁻¹ EDDS使地下部(根)和地上部(茎和叶混合)组织中Cd含量均显著大于CK,且在1.5 mmol·L⁻¹时Cd积累量达到最大(分别为31.954 mg·kg⁻¹和109.454 mg·kg⁻¹),富集系数和转运系数也达到最大(分别为3.521和3.426);随施加EDDS浓度的升高,植物地下部和地上部组织中过氧化氢酶(CAT)、抗坏血酸过氧化物酶(APX)、谷胱甘肽还原酶(GR)、过氧化物酶(POD)、超氧化物歧化酶(SOD)活性呈现先增强后降低或持续增强的趋势,说明抗氧化酶系统被启动,以清除胁迫过程中积累的活性氧(ROS),缓解胁迫对植物造成的膜脂过氧化损伤。因此,施加适宜浓度的EDDS可促进三叶鬼针草幼苗的生长,增加三叶鬼针草对Cd的吸收和富集能力,有利于Cd污染土壤的修复,综合考虑螯合剂的成本以及对土壤造成的二次污染,宜选用EDDS的浓度为1.5 mmol·L⁻¹。

关键词:EDDS;Cd胁迫;三叶鬼针草;生长;抗氧化酶;Cd积累

中图分类号:X503.23 **文献标志码:**A **文章编号:**1672–2043(2018)05–0875–08 **doi:**10.11654/jaes.2017–1116

Effects of EDDS on growth, antioxidant enzyme, and Cd accumulation of *Bidens pilosa* L. seedlings under Cd stress

YANG Bo, CHEN Yin-ping*, KE Yun-qi, YAN Zhi-qiang, YU Pei-dong, SHI Xiao-ping

(School of Environmental and Municipal Engineering, Lanzhou Jiaotong University, Lanzhou 730070, China)

Abstract: A pot experiment was conducted to study the effects of adding 0 (CK), 0.5, 1.5, 2.5 mmol·L⁻¹, and 5.0 mmol·L⁻¹ ethylenediamine disuccinic acid (EDDS) on growth, antioxidant enzyme activities, and Cd accumulation in *Bidens pilosa* seedlings under 40 mg·kg⁻¹ Cd stress. The results showed that the dry and fresh weight, plant height, and root length of the seedlings were promoted significantly by treatments with 0.5 mmol·L⁻¹ and 1.5 mmol·L⁻¹ EDDS. The belowground (roots) and aboveground (stems and leaves) parts had significant higher level of Cd accumulation in the 0.5, 1.5 mmol·L⁻¹, and 2.5 mmol·L⁻¹ EDDS treatments than that in the CK, but the concentration of 1.5 mmol·L⁻¹ showed the best effect, with the maximum value of 31.954 mg·kg⁻¹ and 109.454 mg·kg⁻¹ in the belowground and aboveground parts, respectively. The highest bioaccumulation factor (3.521) and the highest translocation factor (3.426) were also observed in the 1.5 mmol·L⁻¹ EDDS treatment. With increasing EDDS concentration, activity of catalase (CAT), ascorbate peroxidase (APX), glutathione reductase (GR), peroxidase (POD) and superoxide dismutase (SOD) in the belowground and aboveground parts of *Bidens pilosa* seedlings

收稿日期:2017–08–16 录用日期:2017–12–29

作者简介:杨波(1991—),男,陕西洛南人,硕士研究生,主要研究方向为环境生态学。E-mail:1913817369@qq.com

*通信作者:陈银萍 E-mail:yinpch@mail.lzjtu.cn

基金项目:国家自然科学基金项目(31560161,31260089,31640012)

Project supported: The National Natural Science Foundation of China (31560161, 31260089, 31640012)

under Cd stress appeared to present an initial increasing trend, followed by a decrease or persistent increase. These findings indicated that the antioxidant enzyme system was activated to eliminate reactive oxygen species (ROS) and alleviate membrane lipid peroxidation damage induced by Cd stress. The present results suggested that an appropriate concentration of EDDS could promote the growth of seedlings under Cd stress and increase the capacity for absorption and accumulation of Cd, which is beneficial for the remediation of Cd-contaminated soil. Taking into account the cost of chelating agent and secondary soil pollution caused by the chelating agent, the appropriate concentration of EDDS was found to be $1.5 \text{ mmol} \cdot \text{L}^{-1}$.

Keywords: EDDS; Cd stress; *Bidens pilosa* L.; growth; antioxidant enzyme; Cd accumulation

随着人类文明的进步,工业化不断加强,在促进经济发展和提高人民生活水平的同时,越来越多的环境问题相继出现,尤其是由采矿、废气排放、污水灌溉和使用重金属超标制品等人为因素所致的重金属污染日益加剧,引起了世界各国科学家的高度重视,重金属污染防治已迫在眉睫。Cd 污染是常见的重金属污染之一,据全国土壤污染状况调查,Cd 含量分布呈现从西北到东南、从东北到西南方向逐渐升高的态势,Cd 污染物点位超标率为 7.0%, 总体情况不容乐观^[1]。

重金属污染土壤的传统修复方法,如开挖、洗涤和土地填埋等,由于对环境破坏大且成本高昂,限制了其可行性^[2]。而植物修复技术是一种生物友好型的技术,越来越受到人们的关注^[3-4]。但是它也有重大缺陷,就是对重金属提取率不高。近年来,有大量关于施用螯合剂以增强植物对重金属的吸收和富集的研究报道,其中生物友好型的螯合剂乙二胺二琥珀酸(EDDS)备受关注。Luo 等^[5]研究表明,EDDS 可以增强多种植物物种对重金属 Cd、Cu、Pb、Zn 和 Ni 的摄取量。白薇杨等^[6]发现,螯合剂的存在明显增加了植物对重金属 Pb、Cu 和 Cd 的富集系数,且 EDDS 对环境的风险比较小。Attinti 等^[7]研究了 EDDS 对香根草萃取 Pb 效率的影响,土壤和渗滤液结果表明,EDDS 的应用增加了土壤中 Pb 的溶解度。

三叶鬼针草(*Bidens pilosa* L.)是一年生草本植物,生物量大,根系发达,抗逆性强,具有较强的争光、争水和争肥能力,对重金属污染耐性强,富集性和转移性高^[8],是修复重金属污染土壤较理想的种质资源^[9],但关于 EDDS 强化三叶鬼针草吸收 Cd 的能力尚不明确。

本文通过盆栽实验研究不同浓度 EDDS 对 Cd 污染条件下三叶鬼针草生长、抗氧化酶活性、Cd 含量以及 Cd 富集系数和转运系数的影响,以期在三叶鬼针草和 EDDS 应用于 Cd 污染土壤的修复提供科学依据。

1 材料与方法

1.1 材料与试剂

三叶鬼针草种子购自泰山野菜种植基地。EDDS 为麦卡希试剂,现用现配,其结构如下所示:

1.2 实验设计

实验土壤为采自甘肃省兰州市榆中县($103^{\circ}49'15'' \sim 104^{\circ}34'40''\text{E}$, $35^{\circ}34'20'' \sim 36^{\circ}26'30''\text{N}$)周边农田耕地 0~20 cm 的表层土,室内自然风干后过 2 mm 筛备用。土壤基本理化性质:pH 值 7.76,有机质含量 $19.80 \text{ g} \cdot \text{kg}^{-1}$,全氮含量 $1.19 \text{ g} \cdot \text{kg}^{-1}$,Cd 含量 $0.49 \text{ mg} \cdot \text{kg}^{-1}$ 。将 2 kg 表层土壤与一定量的污染物(以 $\text{CdCl}_2 \cdot 2.5\text{H}_2\text{O}$ 模拟 Cd 胁迫,浓度为 $40 \text{ mg} \cdot \text{kg}^{-1}$,以溶液加入到土壤中)充分混匀后装入塑料盆(口径 20 cm、高度 15 cm),平衡 3 周后,选取均匀、饱满的三叶鬼针草种子,将其浸泡在 1% NaClO 溶液中 10 min,用蒸馏水冲洗干净,晾干后播种以提高种子的发芽率和抗病性。种子播种到塑料盆中,播种深度 0.5 cm,盆栽置于光照培养架上,在温度 $15 \sim 25^{\circ}\text{C}$ 、色温 6500 K 光照下,每日光照 14 h(6:00—20:00),黑暗 10 h,不定期的更换位置,待发芽后间苗,每盆 10 株,植株在重金属污染土壤中生长,以自来水浇灌(水中未检测出 Cd),使土壤含水量经常保持在田间持水量(该土壤田间持水量在 20% 左右)的 70% 左右。为防止污染物淋溶渗漏损失,在盆下放置塑料托盘并将渗滤液倒回盆中。待三叶鬼针草生长 60 d 左右、长出 6 片真叶时,配制浓度为 0(对照,CK)、0.5、1.5、2.5、5.0 $\text{mmol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的 EDDS 溶液,将其 pH 调到 7.0。分别取上述浓度的溶液 100 mL 施入土壤中,每个处理 3 个平行,7 d 后取样进行各指标测定。

1.3 测定方法

1.3.1 生长指标的测定

取不同处理的植株各5株,小心抖落根系土,然后依次用自来水和蒸馏水分别小心冲洗3次,操作时尽量不损伤根系,用滤纸吸干水分。分别称量地上部(茎和叶混合)和地下部(根)鲜重,用直尺测量其根长及株高。再将鲜植株置于烘箱中105℃杀青20 min,之后75℃下烘干至恒重,称其地上部及地下部干重^[10]。

1.3.2 Cd含量的测定

将烘干后的植物地上部和地下部分别研磨,称取0.5 g于消解管中,加入15 mL HNO₃-HClO₄(4:1, V/V),用DigiBlock EHD20型高温消解仪消解至澄清,定容至25 mL;将花盆中土壤风干,用四分法取部分样品研磨过0.149 mm筛,称取0.5 g,用HCl-HF-HNO₃-HClO₄法消解至澄清,定容至25 mL。用美国Nicolet公司的220型火焰原子吸收分光光度计测定Cd含量^[11]。

1.3.3 酶活性测定

紫外分光光度法测定抗坏血酸氧化酶(APX)、谷胱甘肽还原酶(GR)和过氧化氢酶(CAT)活性,愈创木酚法测定过氧化物酶(POD)活性,氮蓝四唑法测定超氧化物歧化酶(SOD)活性^[12]。

以上所有指标的测定均重复3次。

1.3.4 数据统计与分析

富集系数(Bioaccumulation Factor, BF)也称吸收系数,是指植物重金属浓度(地上部和地下部Cd浓度之和)与土壤中重金属浓度(土壤Cd添加量即40 mg·kg⁻¹)之比;转运系数(Translocation Factor, TF)是指植物地上部重金属浓度与地下部同种重金属浓度的比值^[13]。

采用Excel和SPSS 17.0软件进行数据处理和分

析,利用Origin 2016软件绘图。采用单因素方差分析(One-way ANOVA)和Duncan法进行多重比较。

2 结果与分析

2.1 EDDS对Cd胁迫下三叶鬼针草生长的影响

加入EDDS培养7 d之后,对比各处理对生长的影响(表1)可知:40 mg·kg⁻¹ Cd胁迫下,0.5~1.5 mmol·L⁻¹的EDDS有利于三叶鬼针草生长,但是施加2.5~5.0 mmol·L⁻¹的EDDS不利于其生长。与CK相比,施加0.5 mmol·L⁻¹和1.5 mmol·L⁻¹ EDDS分别使株高增加19.03%和16.69%、根长增加13.10%和10.48%、地下部鲜重增加54.55%和45.45%、地上部鲜重增加54.49%和42.95%、地下部干重增加32.64%和7.53%、地上部干重增加23.99%和19.49%(*P*<0.05);而施加2.5 mmol·L⁻¹和5.0 mmol·L⁻¹ EDDS均抑制了植物生长,使株高、根长、地下部和地上部鲜重、干重显著降低(*P*<0.05)。

2.2 EDDS对Cd胁迫下三叶鬼针草Cd含量及富集和转运系数的影响

随着EDDS浓度的升高,地上部和地下部Cd含量、转运系数以及富集系数均呈先增后减的趋势,但土壤Cd含量呈先减后增的趋势(表2)。由表2可看出,施加5.0 mmol·L⁻¹ EDDS时,土壤中Cd含量最高,与CK相比无显著差异,且显著高于其他处理,这是因为高浓度EDDS对植物生长有抑制作用,使其生长状况不良,对Cd的吸收量减少,使土壤中Cd含量较高;而施加0.5~2.5 mmol·L⁻¹ EDDS时,由于植物对Cd的吸收作用,导致土壤中Cd含量低于CK。

与CK相比,施加低浓度(0.5~1.5 mmol·L⁻¹)EDDS,均使植物地上部、地下部Cd含量显著增加,其中施加1.5 mmol·L⁻¹ EDDS使地上部和地下部Cd含量达到最高,分别比CK显著增加了146.72%和26.31%

表1 EDDS对Cd胁迫下三叶鬼针草幼苗生长的影响(平均数±SE)

Table 1 Effects of EDDS on the growth of the *Bidens pilosa* seedlings under Cd stress (mean±SE)

EDDS 浓度 EDDS concentration/ mmol·L ⁻¹	株高 Height/cm	根长 Root length/cm	地下部鲜重 Belowground part fresh weight/g·株 ⁻¹	地下部干重 Belowground part dry weight/g·株 ⁻¹	地上部鲜重 Aboveground part fresh weight/g·株 ⁻¹	地上部干重 Aboveground part dry weight/g·株 ⁻¹
0	9.63±0.49b	7.63±0.25ab	0.11±0.01b	0.023 9±0.000 9b	1.56±0.10b	0.355 6±0.026 6b
0.5	11.47±0.45a	8.63±0.95a	0.17±0.03a	0.031 7±0.000 6a	2.41±0.10a	0.440 9±0.001 7a
1.5	11.27±1.05a	8.43±0.51a	0.16±0.01a	0.025 7±0.000 9a	2.23±0.10a	0.424 9±0.021 7a
2.5	8.60±0.36b	7.33±0.70b	0.10±0.02b	0.018 6±0.002 5c	1.24±0.17c	0.296 1±0.042 2c
5.0	7.13±0.49c	7.13±0.42b	0.08±0.02b	0.015 3±0.003 4d	1.04±0.13c	0.132 7±0.012 9d

注:同列中不同小写字母表示差异显著(*P*<0.05)。下同。

Note: Different small letters in the same column indicate the significant differences (*P*<0.05). The same below.

表2 EDDS对Cd胁迫下三叶鬼针草不同部位Cd含量、富集系数及转运系数的影响(平均数±SE)
Table 2 Effects of EDDS on Cd content in different parts, bioaccumulation factor, and translocation factor of the *Bidens pilosa* seedlings under Cd stress (mean ± SE)

EDDS 浓度 EDDS concentration/ mmol·L ⁻¹	Cd 含量(DW)Cd content in different parts/mg·kg ⁻¹			富集系数 Bioaccumulation factor	转运系数 Translocation factor
	地下部分 Belowground part(root)	地上部分 Aboveground part(stem and leaf)	土壤 Soil		
0	25.298±0.331c	44.400±0.257d	39.188±0.182a	1.734±0.010d	1.755±0.031d
0.5	26.577±0.472b	90.069±0.540b	38.402±0.394b	2.381±0.031b	3.392±0.075a
1.5	31.954±0.360a	109.454±0.238a	37.203±0.447c	3.521±0.020a	3.426±0.040a
2.5	19.437±0.265d	55.397±0.207c	38.265±0.184b	1.874±0.020c	2.850±0.032b
5.0	15.480±0.158e	30.706±3.065e	39.570±0.296a	1.146±0.076e	1.983±0.186c

($P<0.05$),其中地上部分Cd含量达到109.454 mg·kg⁻¹,大于土壤重金属污染修复植物应具备的茎或叶富集重金属的临界Cd含量(100 mg·kg⁻¹)。而施加2.5 mmol·L⁻¹和5.0 mmol·L⁻¹EDDS均使地下部Cd含量显著减少,施加5.0 mmol·L⁻¹EDDS使地上部Cd含量显著减少($P<0.05$)。

施加0.5~2.5 mmol·L⁻¹EDDS使富集系数和转运系数均显著高于CK($P<0.05$),且大于1.0,说明Cd胁迫下较低浓度的EDDS可显著增加三叶鬼针草对Cd的富集和转运作用。而施加5.0 mmol·L⁻¹EDDS,富集系数明显低于CK,说明该浓度不利于三叶鬼针草对Cd的吸收,但转运系数略高于CK。

2.3 EDDS对Cd胁迫下三叶鬼针草抗氧化酶系统的影响

如图1A所示,只有0.5 mmol·L⁻¹EDDS使根中APX活性略高于CK,其余浓度EDDS均使根中APX活性显著低于CK($P<0.05$);茎中APX活性在施加1.5 mmol·L⁻¹EDDS后达到最大且显著高于CK,而其余浓度均使APX活性显著低于CK($P<0.05$);叶中APX活性在施加较低浓度(0.5 mmol·L⁻¹和1.5 mmol·L⁻¹)EDDS后显著增强,且在1.5 mmol·L⁻¹EDDS时达到最大,较CK显著增加了66.84%($P<0.05$),但随着EDDS施加浓度的进一步增加,在施加2.5 mmol·L⁻¹EDDS后APX活性增加不显著($P>0.05$),在施加5.0 mmol·L⁻¹EDDS后则显著降低($P<0.05$)。

如图1B所示,随施加EDDS浓度的升高,根中CAT活性呈先升后降的趋势,0.5~2.5 mmol·L⁻¹EDDS均使根中CAT活性显著高于CK($P<0.05$),且在施加2.5 mmol·L⁻¹EDDS时达到最大,较CK增加了105.34%,而在施加5.0 mmol·L⁻¹EDDS时显著低于CK($P<0.05$);茎中CAT活性呈一直上升的趋势,且在施加5.0 mmol·L⁻¹EDDS时达到最大;叶中CAT活性虽然呈先升后降的趋势,但其活性均显著高于CK

($P<0.05$)。

如图1C所示,除0.5 mmol·L⁻¹EDDS使根中GR活性低于CK外,其余浓度使根、茎和叶中GR均显著高于CK($P<0.05$)。随施加EDDS浓度的升高,根中GR活性呈一直增强的趋势,茎中在0.5 mmol·L⁻¹EDDS时达到最大,之后呈一直下降的趋势,但仍显著高于CK,叶中随施加EDDS浓度的升高呈先升后降的趋势,在施加2.5 mmol·L⁻¹EDDS时达到最大,在5.0 mmol·L⁻¹EDDS时显著下降,但仍显著高于CK。

如图1D所示,施加0.5 mmol·L⁻¹EDDS使根、茎、叶中POD活性显著增强,较CK分别增加了112.60%、174.31%、154.86%($P<0.05$),但随施加EDDS浓度的升高,POD活性则持续下降。

如图1E所示,施加0.5 mmol·L⁻¹EDDS使根中SOD活性显著增强,较CK增加了213.37%($P<0.05$),随施加EDDS浓度的升高,根中SOD活性呈一直下降的趋势,与CK无显著差异($P>0.05$);茎中SOD活性随施加EDDS浓度的升高呈先升后降的趋势,在施加2.5 mmol·L⁻¹EDDS时达到最大,较CK显著增加了29.59%($P<0.05$);施加0.5、2.5、5.0 mmol·L⁻¹EDDS均使叶中SOD活性显著高于CK($P<0.05$),尽管施加1.5 mmol·L⁻¹EDDS时与CK差异不显著,但SOD活性仍有提高。

2.4 三叶鬼针草幼苗根中Cd含量与抗氧化酶系统的相关性及回归分析

根是植物吸收重金属的主要部位,进而才向地上部分转移,为探讨三叶鬼针草幼苗中抗氧化酶系统是否对其吸收和积累Cd的能力有影响,本研究对三叶鬼针草幼苗根中Cd含量与抗氧化酶系统做了相关性分析及回归分析,结果表明(表3):根中Cd含量与GR和APX负相关,与CAT、POD、SOD呈正相关,但其相关性并不显著,说明抗氧化酶系统与三叶鬼针草幼苗吸收和积累Cd的能力没有直接的相关性,但Cd胁迫

图中不同小写字母表示各处理间差异显著(P<0.05)
 Different small letters indicate significant differences among different treatments(P<0.05)
 图1 EDDS对Cd胁迫下三叶鬼针草幼苗APX、CAT、GR、POD和SOD活性的影响

Figure 1 Effects of EDDS on activities of APX, CAT, GR, POD, and SOD in the *Bidens pilosa* seedlings under Cd stress

胁迫下,随着EDDS浓度的变化抗氧化酶系统被启动,对胁迫过程中积累的活性氧进行清除,减轻了外界胁迫对植物造成的膜损害。

回归分析结果如下:

$$Y=25.033-18.897X_1 \quad R^2=0.052$$

$$Y=14.758+0.060X_2 \quad R^2=0.308$$

$$Y=37.492-36.265X_3 \quad R^2=0.254$$

$$Y=8.241+0.157X_4 \quad R^2=0.250$$

$$Y=9.180+0.983X_5 \quad R^2=0.314$$

式中Y为Cd含量, X_1 、 X_2 、 X_3 、 X_4 、 X_5 分别为APX、CAT、GR、POD、SOD活性,R为相关系数。回归分析与相关性分析结果相同。

3 讨论

3.1 EDDS对Cd胁迫下三叶鬼针草生长及Cd富集能力的影响

整合剂对金属离子具有较强的整合能力,进入土壤后,可活化土壤中重金属,减少土壤对重金属的吸

表3 三叶鬼针草幼苗根中抗氧化酶系统和 Cd 积累的相关性分析

Table 3 Correlations between antioxidant enzyme system and Cd accumulation in *Bidens pilosa* root

	Cd 含量	APX	CAT	GR	POD	SOD
Cd 含量	1.000					
APX	-0.229	1.000				
CAT	0.555	-0.218	1.000			
GR	-0.504	-0.725	-0.220	1.000		
POD	0.500	0.725	-0.266	-0.998**	1.000	
SOD	0.560	0.596	0.542	-0.934*	0.952*	1.000

注:*表示在0.05水平(双侧)上显著相关,**表示在0.01水平(双侧)上显著相关。

Note:*indicates a significant correlation at 0.05 level(both sides),** indicates a significant correlation at 0.01 level(both sides).

附,提高植物对重金属的可利用性,进而被植物最大限度地吸收^[14]。目前,螯合剂辅助植物修复重金属污染土壤已成为研究热点之一。但是,施用螯合剂也有一定的风险,如对植物产生毒性(影响其生长、叶片变黄等)^[15-16],破坏土壤结构,使其养分流失,对土壤生态环境造成影响等。本研究结果表明:Cd胁迫下,施加较低浓度的EDDS有利于三叶鬼针草幼苗的生长,使株高、根长、地上部鲜干重和地下部鲜干重显著增加,而施加高浓度EDDS则不利于植物的生长,由表1可看出株高、根长、地下部和地上部鲜重、干重显著降低。该结果与袁菊红^[13]和Hseu等^[17]研究结果一致,但刘金等^[18]发现EDDS会不同程度减少苕麻生物量,熊国焕等^[19]的结果表明EDDS对大叶井口边草生物量无明显的影响。这种结果的差异可能与植物物种,试验方法,螯合剂种类、浓度、施加方式、施加时间,土壤类型等不同有关,而且这种差异究竟是何种原因导致还需进一步研究。

适宜浓度的EDDS可增加土壤中重金属活性而被植物更有效地吸收,促进植物地上部对重金属更多的吸收和累积。在土壤重金属污染植物修复研究中,富集系数越大,表明植物对重金属的吸收累积能力就越强;转移系数越大,则表明重金属从根系向地上部器官转运能力就越强^[20],越有利于植物修复重金属污染土壤。研究表明EDDS可促进苕麻对Cd的吸收^[21],增加向日葵对铀的吸收和转运能力^[22],促进金盏菊根、茎、叶各器官对Cd的富集^[23],增加菊花和黑麦草对Cu的积累^[24]。本研究结果表明:Cd胁迫下,施加低浓度EDDS显著增加了三叶鬼针草地上部和地下部Cd含量,其中施加 $1.5\text{ mmol}\cdot\text{L}^{-1}$ 时,Cd积累量大于土

壤重金属Cd污染修复植物应具备的茎或叶富集重金属的临界含量,说明低浓度EDDS可显著增强植物对Cd的吸收和积累,而且三叶鬼针草的富集系数与转移均在1.0之上,表明其具有超富集植物的特征^[25];而高浓度则受到抑制,这可能是由于高浓度EDDS对三叶鬼针草有一定毒害作用,不利于植物生长。除施加 $5.0\text{ mmol}\cdot\text{L}^{-1}$ EDDS富集系数低于CK以外,添加EDDS使富集系数和转运系数均高于CK,表明EDDS可以促进Cd在植物中富集以及向地上部转移,在植物修复方面是有利的。

3.2 EDDS对Cd胁迫下三叶鬼针草抗氧化酶系统的影响

在没有受到外界胁迫的情况下,植物体内活性氧(ROS)代谢处于稳定状态。在Cd和EDDS的胁迫下植物体内平衡被打破,对植物生长和生理特性产生影响,进而影响植物的生长发育。因此,植物将对这种变化做出反应,比如激活抗氧化酶系统,使之酶活性提高以维持活性氧平衡^[26-28]。研究表明神处理使大叶井口边草叶^[29]、黑麦草和丛枝菌根单一或联合修复使黑麦草^[30]、酸雨使毛竹^[31]、低浓度Cd胁迫使三叶鬼针草幼苗^[32]中抗氧化酶被诱导,活性增强,最大限度清除自由基,防止其对植物的损伤。本研究结果表明:Cd胁迫下,施加不同浓度的EDDS,三叶鬼针草根、茎和叶中APX、CAT、GR、POD和SOD活性变化不尽相同。在施加低浓度EDDS时,根中CAT和GR优先启动,茎中APX、CAT和SOD优先启动,叶中APX、CAT和GR优先启动,清除植物体内多余的ROS,保护植物细胞膜。在施加高浓度EDDS时,根中APX、POD和SOD起主要作用,茎中GR和POD,叶中SOD和POD起主要作用,从而减轻了外界胁迫对植物造成的膜伤害。酶活性在植物体内反复变化一方面说明对Cd胁迫和EDDS较为敏感,另一方面也表明植物随着Cd胁迫的持续以及EDDS浓度和环境的变化在不断调整自身,从而适应多变环境,减轻逆境对植物自身的伤害,促进植物生长,并增加对重金属的富集和转运^[11]。酶作用的不同可能是由于植物物种的种类、器官、实验条件等差异造成的,具体是何原因主导需进一步实验探索。

本研究中,尽管抗氧化酶系统与三叶鬼针草幼苗吸收和积累Cd的能力没有直接的相关性,但在Cd胁迫下,施加低浓度EDDS($0.5\sim 2.5\text{ mmol}\cdot\text{L}^{-1}$)三叶鬼针草根中CAT、GR、SOD和POD活性能够维持或增加,其中CAT活性增加尤为显著,表明其具有强大的

清除自由基的能力,减轻了胁迫对植物膜系统造成的损害,维持植物正常生长状况,有利于Cd的富集。而施加 $5.0\text{ mmol}\cdot\text{L}^{-1}$ EDDS 5种酶均显著低于CK,说明Cd胁迫和高浓度的EDDS对植物造成的影响已超过了植物抗氧化能力限度,引起细胞代谢失调,抑制了酶的合成,不能有效清除活性氧,细胞膜系统受损,植物生长受到抑制,对Cd的吸收减少。表明EDDS施入Cd污染土壤后,通过影响三叶鬼针草生理生化过程以响应重金属Cd的胁迫^[33]。

4 结论

(1)Cd胁迫下,施加低浓度EDDS会显著促进三叶鬼针草幼苗的生长,增加其对Cd的吸收、富集和转运。

(2)Cd胁迫下,随着不同浓度EDDS的施加,三叶鬼针草幼苗地上部和地下部组织中不同抗氧化酶优先启动,清除Cd胁迫诱导产生的过量ROS,抵御膜脂过氧化,减轻逆境对膜系统造成的损伤。

(3)施加EDDS可增强三叶鬼针草对Cd污染土壤的修复效果,结合生长指标,充分考虑土壤重金属类型和螯合剂可能对环境造成的二次污染,优先选择施用量为 $1.5\text{ mmol}\cdot\text{L}^{-1}$ 。

参考文献:

- [1] 环境保护部,国土资源部.全国土壤污染状况调查公报[J].中国环保产业,2014,1(5):10-11.
Ministry of Environmental Protection, Ministry of Land and Resources. The soil pollution condition investigation communique[J]. *China Environmental Protection Industry*, 2014, 1(5):10-11.
- [2] Nowack B, Schulin R, Robinson B H. Critical assessment of chelant-enhanced metal phytoextraction[J]. *Environmental Science & Technology*, 2006, 40(17):5225-5232.
- [3] Mitch M L. Phytoextraction of toxic metals: A review of biological mechanism[J]. *Journal of Environmental Quality*, 2002, 31(1):109-120.
- [4] Meers E, Ruttens A, Hopgood M, et al. Comparison of EDTA and EDDS as potential soil amendments for enhanced phytoextraction of heavy metals[J]. *Chemosphere*, 2005, 58(8):1011-1022.
- [5] Luo C L, Shen Z G, Lou L Q, et al. EDDS and EDTA-enhanced phytoextraction of metals from artificially contaminated soil and residual effects of chelant compounds[J]. *Environmental Pollution*, 2006, 144(3):862-871.
- [6] 白薇扬,赵清华,谭怀琴.非生物螯合剂EDTA与生物螯合剂EDDS联合施用提高植物提取土壤重金属效应性的研究[J].重庆理工大学学报(自然科学),2013,27(8):47-53,61.
BAI Wei-yang, ZHAO Qing-hua, TAN Huai-qin. Effects of EDTA, EDDS phytoextract artificially polluted soil with heavy metals[J]. *Journal of Chongqing University of Technology(Natural Science)*, 2013, 27(8):47-53, 61.
- [7] Attinti R, Barrett K R, Datta R, et al. Ethylenediamine disuccinic acid (EDDS) enhances phytoextraction of lead by vetiver grass from contaminated residential soils in a panel study in the field[J]. *Environmental Pollution*, 2017, 225(6):524-533.
- [8] 谌金吾,孙一铭,王凤英,等.三叶鬼针草毛状根的诱导及其对重金属Cd、Pb蓄积[J].环境科学学报,2015,35(5):1596-1602.
CHEN Jin-wu, SUN Yi-ming, WANG Feng-ying, et al. Induction and accumulation of cadmium and lead by hairy root of *Bidens pilosa*[J]. *Acta Scientiae Circumstantiae*, 2015, 35(5):1596-1602.
- [9] 弓晓峰,欧丽,刘足根,等.氮磷钾和乙二胺四乙酸对镉污染三叶鬼针草的吸收特征研究[J].环境污染与防治,2011,33(2):1-6,11.
GONG Xiao-feng, OU Li, LIU Zu-gen, et al. Effect of nutrient elements and EDTA on the cadmium bioaccumulation of *Bidens pilosa*[J]. *Environmental Pollution & Control*, 2011, 33(2):1-6, 11.
- [10] 王芳,常盼盼,陈永平,等.外源NO对镉胁迫下玉米幼苗生长和生理特性的影响[J].草业学报,2013,22(2):178-186.
WANG Fang, CHANG Pan-pan, CHEN Yong-ping, et al. Effect of exogenous nitric oxide on seedling growth and physiological characteristics of maize seedlings under cadmium stress[J]. *Acta Prataculturae Sinica*, 2013, 22(2):178-186.
- [11] 刘柿良,潘远智,杨容子,等.外源一氧化氮对镉胁迫下长春花质膜过氧化、ATPase及矿质营养吸收的影响[J].植物营养与肥料学报,2014,20(2):445-458.
LIU Shi-liang, PAN Yuan-zhi, YANG Rong-jie, et al. Effects of exogenous NO on mineral nutrition absorption, lipid peroxidation and ATPase of plasma membrane in *Catharanthus roseus* tissues under cadmium stress[J]. *Journal of Plant Nutrition and Fertilizer*, 2014, 20(2):445-458.
- [12] 陈银萍,蒯苗苗,苏向楠,等.外源一氧化氮对镉胁迫下紫花苜蓿幼苗活性氧代谢和镉积累的影响[J].农业环境科学学报,2015,34(12):2261-2271.
CHEN Yin-ping, QU Miao-miao, SU Xiang-nan, et al. Effect of exogenous nitric oxide on active oxygen metabolism and cadmium accumulation in alfalfa seedlings under cadmium stress[J]. *Journal of Agro-Environment Science*, 2015, 34(12):2261-2271.
- [13] 袁菊红. Se胁迫条件下EDDS对彩叶草生长和生理指标及Se含量的影响[J].植物资源与环境学报,2012,21(4):87-93.
YUAN Ju-hong. Effects of EDDS on growth, physiological indexes and Se content of *Coleus blumei* under Se stress[J]. *Journal of Plant Resources and Environment*, 2012, 21(4):87-93.
- [14] Epstein A L, Gussman C D, Blaylock M J, et al. EDTA and Pb-EDTA accumulation in *Brassica juncea* grown in Pb-amended soil[J]. *Plant and Soil*, 1999, 208(1):87-94.
- [15] 胡亚虎,魏树和,周启星,等.螯合剂在重金属污染土壤植物修复中的应用研究进展[J].农业环境科学学报,2010,29(11):2055-2063.
HU Ya-hu, WEI Shu-he, ZHOU Qi-xing, et al. Application of chelator in phytoremediation of heavy metals contaminated soils: A review[J]. *Journal of Agro-Environment Science*, 2010, 29(11):2055-2063.
- [16] Römkens P, Bouwman L, Japenga J, et al. Potentials and drawbacks of chelate-enhanced phytoremediation of soils[J]. *Environmental Pollu-*

- tion, 2002, 116(1):109-121.
- [17] Hseu Z Y, Jien S H, Wang S H, et al. Using EDDS and NTA for enhanced phytoextraction of Cd by water spinach[J]. *Journal of Environmental Management*, 2013, 117(1):58-64.
- [18] 刘金, 殷宪强, 孙慧敏, 等. EDDS与EDTA强化苕麻修复镉铅污染土壤[J]. *农业环境科学学报*, 2015, 34(7):1293-1300.
LIU Jin, YIN Xian-qiang, SUN Hui-min, et al. EDTA and EDDS enhanced remediation of Cd and Pb contaminated soil by ramie (*Boehmeria nivea*) [J]. *Journal of Agro-Environment Science*, 2015, 34(7):1293-1300.
- [19] 熊国焕, 潘义宏, 何艳明, 等. 螯合剂对大叶井口边草 Pb、Cd、As 吸收性影响研究[J]. *土壤*, 2012, 44(2):282-289.
XIONG Gou-huan, PAN Yi-hong, HE Yan-ming, et al. Chelate assisted uptake of heavy metal of lead, cadmium and arsenic from soil with *Pteris cretica* var. *nervosa* [J]. *Soils*, 2012, 44(2):282-289.
- [20] 孙约兵, 周启星, 任丽萍. 镉超富集植物球果苘菜对镉-砷复合污染的反应及其吸收积累特征[J]. *环境科学*, 2007, 28(6):1355-1360.
SUN Yue-bing, ZHOU Qi-xing, REN Li-ping. Growth responses of *Rorippa globosa* and its accumulation characteristics of Cd and As under the Cd-As combined pollution [J]. *Environmental Science*, 2007, 28(6):1355-1360.
- [21] 拓朵朵. EDTA与EDDS强化苕麻修复汞镉复合污染土壤的研究 [D]. 杨凌:西北农林科技大学, 2016.
TUO Duo-duo. Study on EDTA and EDDS strengthening ramie to restore Hg/Cd contamination soil [D]. Yangling: Northwest Agriculture and Forestry University, 2016.
- [22] 陈立, 王丹, 龙婵, 等. 三种螯合剂对向日葵修复铊污染土壤的效应研究[J]. *中国农学通报*, 2017, 33(11):81-88.
CHEN Li, WANG Dan, LONG Chan, et al. Effect of three chelating agents on U polluted soil repairing by sunflower [J]. *Chinese Agricultural Science Bulletin*, 2017, 33(11):81-88.
- [23] 白雪. EDDS强化金盏菊修复重金属污染土壤及环境风险分析 [D]. 重庆:西南大学, 2014.
BAI Xue. Study on EDDS strengthening *Calendula officinalis* to restore heavy metals soils and environmental assessment [D]. Chongqing: Southwest University, 2014.
- [24] Li Y, Luo C L, Liu Y, et al. Residual effects of EDDS leachates on plants during EDDS-assisted phytoremediation of copper contaminated soil [J]. *Science of the Total Environment*, 2013, 444(1):263-270.
- [25] Brooks R R. Plants that hyperaccumulate heavy metals: Their role in phytoremediation, microbiology, archaeology, mineral exploration and phytomining [M]. Oxford, UK: CAB International, 1998.
- [26] Rosenbaugh E G, Manickam D S, Batrakova E V, et al. Neuronal uptake and subcellular localization of functional nanoformulated copper/zinc superoxide dismutase (SOD nano) [J]. *The FASEB Journal*, 2012, 26:893.
- [27] Noctor G, Foyer C H. Ascorbate and glutathione: Keeping active oxygen under control [J]. *Annual Review of Plant Biology*, 1998, 49(1):249-279.
- [28] 王松华, 张华, 何庆元. 铜胁迫对紫花苜蓿幼苗叶片抗氧化系统的影响 [J]. *应用生态学报*, 2011, 22(9):2285-2290.
WANG Song-hua, ZHANG Hua, HE Qing-yuan. Effects of copper stress on *Medicago sativa* seedlings leaf antioxidative system [J]. *Chinese Journal of Applied Ecology*, 2011, 22(9):2285-2290.
- [29] 胡拥军, 王海娟, 王宏镛, 等. 砷胁迫下不同砷富集能力植物内生生长素与抗氧化酶的关系 [J]. *生态学报*, 2015, 35(10):3214-3224.
HU Yong-jun, WANG Hai-juan, WANG Hong-bin, et al. The relationship between endogenous auxin and antioxidative enzymes in two plants with different arsenic-accumulative ability under arsenic stress [J]. *Acta Ecologica Sinica*, 2015, 35(10):3214-3224.
- [30] 江玲, 杨芸, 徐卫红, 等. 黑麦草-丛枝菌根对不同番茄品种抗氧化酶活性、镉积累及化学形态的影响 [J]. *环境科学*, 2014, 35(6):2349-2357.
JIANG Ling, YANG Yun, XU Wei-hong, et al. Effects of ryegrass and arbuscular mycorrhiza on activities of antioxidant enzymes, accumulation and chemical forms of cadmium in different varieties of tomato [J]. *Environmental Science*, 2014, 35(6):2349-2357.
- [31] 郭慧媛, 马元丹, 王丹, 等. 模拟酸雨对毛竹叶片抗氧化酶活性及释放绿叶挥发物的影响 [J]. *植物生态学报*, 2014, 38(8):896-903.
GUO Hui-yuan, MA Yuan-dan, WANG Dan, et al. Effects of simulated acid rain on the activity of antioxidant enzyme and the emission of induced green leaf volatiles in *Phyllostachys pubescens* [J]. *Chinese Journal of Plant Ecology*, 2014, 38(8):896-903.
- [32] 孙约兵, 周启星, 王林, 等. 三叶鬼针草幼苗对镉污染的耐性及其吸收积累特征研究 [J]. *环境科学*, 2009, 30(10):3028-3035.
SUN Yue-bing, ZHOU Qi-xing, WANG Lin, et al. Characteristics of cadmium tolerance and bioaccumulation of *Bidens pilosa* seedlings [J]. *Environmental Science*, 2009, 30(10):3028-3035.
- [33] 罗艳, 张世熔, 徐小逊, 等. 可降解螯合剂对镉胁迫下籽粒苋根系形态及生理生化特征的影响 [J]. *生态学报*, 2014, 34(20):5774-5781.
LUO Yan, ZHANG Shi-rong, XU Xiao-xun, et al. Effects of biodegradable chelants on the root morphology and physiological-biochemical characteristics of *Amaranthus hybridus* L. in cadmium contaminated soils [J]. *Acta Ecologica Sinica*, 2014, 34(20):5774-5781.